

 SERVIZIO SANITARIO REGIONALE EMILIA-ROMAGNA Azienda Unità Sanitaria Locale di Reggio Emilia <small>IRCCS Istituto in tecnologie avanzate e modelli assistenziali in oncologia</small>	FORMULAIRE	Page 1 sur 3
	RECOMMANDATIONS GÉNÉRALES POUR LE LAVAGE INTESTINAL PRÉALABLE À LA COLOSCOPIE	Code MO 35
SERVICE ONCOLOGIE ET TECHNOLOGIES AVANCÉES GASTRO-ENTÉROLOGIE ET ENDOSCOPIE DIGESTIVE		Rév. 00 du 01/02/2023

RECOMMANDATIONS GÉNÉRALES POUR LE LAVAGE INTESTINAL PRÉALABLE À LA COLOSCOPIE

Évitez de manger des fruits à pépins (par exemple : kiwis, fraises, raisins, pastèque) et des légumes (par exemple : tomates et salades en général) durant les 3 jours précédant l'examen car ces aliments peuvent rendre l'examen difficile à réaliser et limiter sa précision.

Pendant la prise de la solution laxative et jusqu'à deux heures avant la réalisation de l'examen, vous pouvez boire de l'eau, du thé, de la camomille, du café d'orge, éventuellement avec du sucre.

La veille de l'examen, le régime alimentaire doit être léger (par exemple, de la soupe). Évitez de consommer des aliments une fois la solution préparée entamée.

L'apparition possible de nausées ou d'une sensation de dégoût lors de la prise du produit est normale et ne doit pas inquiéter. Buvez le liquide plus lentement à petites gorgées (conservé au réfrigérateur, il peut être plus agréable à avaler) et corrigez-en le goût en le mélangeant avec d'autres boissons ayant un goût différent (thé, camomille, etc.).

En cas de symptômes significatifs, contactez votre médecin traitant.

Il est important de boire toute la solution de la manière indiquée pour que l'examen puisse être réalisé correctement ; une préparation incomplète réduit la fiabilité de la coloscopie et il peut s'avérer nécessaire de répéter la procédure.

Le délai entre la fin de la prise de la solution laxative et la réalisation de la coloscopie doit être compris entre 2 et 4 heures. Si, après avoir bu toute la solution, les selles ne sont pas bien claires/jaunes, envisagez de boire encore du produit de préparation ou au moins d'autres liquides clairs.

Les différentes préparations disponibles sont énumérées ci-dessous

PRÉPARATION À TRÈS FAIBLE VOLUME : **PLENVU** (à base de PEG et acide ascorbique)

PRÉPARATION À FAIBLE VOLUME : **CLENSIA** (à base de PEG et acide citrique), **MOVIPREP** (à base de PEG et acide ascorbique)

PRÉPARATION À HAUT VOLUME : **SELG ESSE** (à base de polyéthylène glycol-PEG et phosphate de sodium)

Mises en garde :

- les préparations à faible et très faible volume ne sont pas recommandées chez les patients constipés (moins de 3 selles par semaine)

- les patients souffrant d'affections cardiologiques ou néphrologiques graves doivent consulter leur médecin spécialiste (pour éviter d'altérer l'équilibre électrolytique).

 SERVIZIO SANITARIO REGIONALE EMILIA-ROMAGNA Azienda Unità Sanitaria Locale di Reggio Emilia <small>IRCCS Istituto in tecnologie avanzate e modelli assistenziali in oncologia</small>	FORMULAIRE	Page 2 sur 3
	RECOMMANDATIONS GÉNÉRALES POUR LE LAVAGE INTESTINAL PRÉALABLE À LA COLOSCOPIE	Code MO 35
SERVICE ONCOLOGIE ET TECHNOLOGIES AVANCÉES GASTRO-ENTÉROLOGIE ET ENDOSCOPIE DIGESTIVE		Rév. 00 du 01/02/2023

Contre-indications :

PLENVU et MOVIPREP sont contre-indiqués chez les patients atteints de phénylcétonurie (en raison de la présence de phénylalanine) et chez les patients présentant un déficit en glucose-6-phosphate déshydrogénase = favisme (en raison de la présence d'acide ascorbique/ascorbate).

PLENVU

Comment boire la solution préparée :

Dose 1 (à boire en une demi-heure dissoute dans un demi-litre d'eau) puis buvez un demi-litre d'eau

Après une heure buvez la Dose 2A + 2B (dissoute dans un demi-litre d'eau) puis buvez un demi-litre d'eau

Quand boire la solution préparée (horaires suggérés)

HORAIRE de la coloscopie 08h00-14h00

La veille de l'examen

De 19h00 à 20h00 buvez la dose 1 de PLENVU dissoute dans un demi-litre d'eau en 30 minutes puis buvez un demi-litre d'eau

Le matin de l'examen

De 05h30 à 06h30 buvez la dose 2 de PLENVU en 30 minutes (dissolvez le contenu de la dose 2A et de la dose 2B collées ensemble dans un demi-litre d'eau) puis buvez 1 litre d'eau

HORAIRE de la coloscopie après 14h00

Le matin de l'examen

À 07h00 buvez la dose 1 de PLENVU en 30 minutes (dissolvez le contenu de la dose 1 dans un demi-litre d'eau) puis buvez un demi-litre d'eau

À 08h00 buvez la dose 2 de PLENVU en 30 minutes (dissolvez le contenu de la dose 2A et de la dose 2B collées ensemble dans un demi-litre d'eau) puis buvez 1 litre d'eau

NOTA BENE : RESPECTEZ la séquence des doses, d'abord la Dose 1 puis la Dose 2A+2B.

CLENSIA ET MOVIPREP

Comment boire la solution préparée

Clensia : la boîte contient 4 sachets A (grands) et 4 sachets B (petits). Reconstituez deux sachets A et deux sachets B dans 1 litre d'eau à boire dans l'heure qui suit.

 SERVIZIO SANITARIO REGIONALE EMILIA-ROMAGNA Azienda Unità Sanitaria Locale di Reggio Emilia <small>IRCCS Istituto in tecnologie avanzate e modelli assistenziali in oncologia</small>	FORMULAIRE	Page 3 sur 3
	RECOMMANDATIONS GÉNÉRALES POUR LE LAVAGE INTESTINAL PRÉALABLE À LA COLOSCOPIE	Code MO 35
SERVICE ONCOLOGIE ET TECHNOLOGIES AVANCÉES GASTRO-ENTÉROLOGIE ET ENDOSCOPIE DIGESTIVE		Rév. 00 du 01/02/2023

Moviprep : la boîte contient 2 sachets transparents contenant chacun un grand sachet A et un petit sachet B. Préparez un litre de Moviprep en dissolvant un sachet A et un sachet B dans 1 litre d'eau jusqu'à dissolution complète (solution limpide). La solution reconstituée doit être bue dans l'heure qui suit.

Quand boire la solution préparée (horaires suggérés)

Horaire de la coloscopie 08h00-10h00

La veille de l'examen : 1 litre de solution préparée de 20h00 à 21h00 puis un demi-litre d'eau

Le matin de l'examen : 1 litre de solution préparée de 05h30 à 06h30 puis un demi-litre d'eau

Horaire de la coloscopie 10h00-14h00

La veille de l'examen : 1 litre de solution préparée de 20h00 à 21h00 puis un demi-litre d'eau

Le matin de l'examen : 1 litre de solution préparée de 06h00 à 07h00 puis un demi-litre d'eau

Horaire de la coloscopie après 14h00

Le matin de l'examen : 2 litres de solution préparée de 08h00 à 10h00 puis un litre d'eau

SELG ESSE (à base de polyéthylène glycol-PEG et phosphate de sodium)

Comment boire la solution préparée : dissolvez chacun des 4 sachets de Selg dans 1 litre d'eau non gazeuse (ou dans des liquides clairs)

Quand boire la solution préparée (horaires suggérés)

Horaire de la coloscopie 08h00-10h00

La veille de l'examen : 3 litres de 19h00 à 22h00

Le matin de l'examen : 1 litre de 05h30 à 06h30

Horaire de la coloscopie 10h00-14h00

La veille de l'examen : 2 litres de 19h00 à 21h00

Le matin de l'examen : 2 litres de 05h30 à 07h30

Horaire de la coloscopie après 14h00

Le matin de l'examen : 4 litres de 07h00 à 11h00